


Infobrief vom 08.08.2025



■ Mit dem Konzept „Teilen & Behandeln“ lässt sich die anstehende Varroa-Bekämpfung elegant mit der Spätsommerpflege der Wirtschaftsvölker verknüpfen.

(Schematisierter Ablauf „TuB“ für 2-zargige Völker, © Dr. Otto Boecking)

Wer unsere Empfehlungen und detaillierte praktische Anleitung zum Thema „Teilen & Behandeln“ (TuB) anhand von Erklärvideos sehen möchte, der findet diese in einer fünfteiligen Videoserie auf unserem YouTube-Kanal unter <https://www.youtube.com/@lavesbieneninstitutcelle/videos>

■ Die Vorteile des Verfahrens „Teilen & Behandeln“

Beim TuB wird das Volk zargenweise geteilt und zunächst ein brutfreier Flugling gebildet, der mit der Königin des zu teilenden Volkes ausgestattet wird. Mit den Brutzargen wird zeitgleich ein Brutling erstellt, der sich eine Nachschaffungskönigin selber aufzieht. So wird in beiden getrennten Volksteilen eine Brutunterbrechung vollzogen, ohne dabei die Brut zu vernichten. Eine Vernichtung der Brut ist in den allermeisten Fällen überhaupt nicht notwendig. Es gilt zu bedenken, wenn rein theoretisch ein 20-prozentiger Varroa-Befall in allen verdeckelten Brutzellen vorhanden wäre, was einem hohen Befall gleichkommt, dann entwickeln sich in 80 Prozent der Brutzellen die Bienen ohne Einfluss und Schädigung durch die Varroa-Milbe. Diesen Anteil der gesunden Brut gilt es zu erhalten. Mit der Brutunterbrechung wird in beiden Volksteilen für einen Neustart gesorgt, was auch die Virenproblematik miterfasst. In der Brutpause sitzen alle Varroa-Milben auf den erwachsenen Bienen und können so wirksam bekämpft werden. Das geschieht beim Flugling zwei Tage nach dem Beginn des TuB. Der Brutling ist 21 Tage nach seiner Erstellung ebenso brutfrei und wird dann behandelt. Lediglich an dem Tag und Folgetag, wenn man mit dem TuB beginnt, muss gutes Flugwetter herrschen, damit die Flugbienen auch

tatsächlich den Flugling besiedeln können. Die anschließende OS-Applikationen können hingegen witterungsunabhängig erfolgen.

Neben der Tatsache, dass die Varroazid-Anwendung im brutfreien Zustand der zwei Volksteile wirksam erfolgt, liegt der Vorteil des TuB zudem darin, diesen Schritt mit der Spätsommerpflege der Wirtschaftsvölker zu verbinden. Werden die Wirtschaftsvölker mit zwei Brutzargen durch die Saison geführt, kann jetzt die ältere, untere Brutzarge mit dunklen Waben im Zuge des TuB am 21.Tag ganz entnommen werden. Bei einzagigen Völkern werden nur die eventuell vorhandenen dunklen Waben aus dem Brutling nach dem Schlupf aller Bienen entnommen und gegen helle Waben ausgetauscht (siehe Anhang). Die alten Waben werden dem Wachsschmelzer zugeführt. Damit erfolgt eine einfache und systematische Wabehygiene, ein wichtiger Bestandteil der „Guten imkerlichen Praxis“. Alte dunkle, mehrfach bebrütete Waben haben in einem Bienenvolk nichts zu suchen. Sie sind mögliche Quellen verschiedener Krankheitserreger und gegebenenfalls von Varroazid-Rückständen. Ein weiterer Vorteil des TuB liegt darin, dass man gegebenenfalls die Erstellung des Fluglings zum Austausch einer alten oder sonst unerwünschten Königin nutzen kann. Dann wird die auszuwechselnde Königin einfach durch eine andere begattete Königin ersetzt. Sie wird, wie sonst auch bei der Erstellung des Fluglings, in einen Zusetzkäfig mit Futterverschluss in den Flugling gehängt.

■ **Bedingungen für ein erfolgreiches „Teilen & Behandeln“**

Jetzt ist die richtige Zeit, das Konzept TuB zu starten. Später besteht die Gefahr, dass der Begattungserfolg der Nachschaffungsköniginnen in den Brutlingen nicht mehr zufriedenstellend ausfällt.

1. Wichtigster erster Schritt für das TuB war eine Varroa-Befalls-Diagnose der Völker Mitte Juli, worauf wir mit unserem Infobrief vom 11.07.2025 hingewiesen hatten. Anschließend werden üblicherweise die leergeschleuderten Honigwaben der letzten Honigernte über Absperrgitter aufgesetzt, sodass die Bienen diese sauberlecken. Dafür brauchen sie etwa drei Tage. Keinesfalls darf mit honigfeuchten Waben der Flugling gebildet werden, denn das endet unweigerlich in einer massiven Räuberei. Auch der Einsatz von Mittelwänden für den Flugling wird nicht gelingen, weil die Bienen diese eher nicht (mehr) ausbauen.
2. Eine weitere wichtige Bedingung für den Erfolg des TuB ist, dass die Bienen ihren Standplatz vor dem Prozedere schon gut kennen. Anders gesagt, bringt man die Wirtschaftsvölker beispielsweise nach einer Wanderung auf einen neuen Standplatz, müssen die Völker sich dort schon eingeflogen und damit gut orientiert haben.
3. Für das TuB eignen sich nur starke Wirtschaftsvölker. Sind Völker zum Beispiel durch einen späten Schwarmabgang beziehungsweise ein starkes Schröpfen oder gar aufgrund hoher Varroa-Last geschwächt, haben die daraus gebildeten Flug- und Brutlinge keine Chance und fallen womöglich der Räuberei durch andere Bienenvölker zum Opfer.

4. Bei allen Arbeitsschritten muss zügig gearbeitet werden, da sonst schnell zu dieser Jahreszeit eine Räuberei ausgelöst wird. Von daher sollte man die frühen Morgenstunden nutzen und alles gut vorbereiten.
5. Stehen die zu teilenden Völker in Reihenaufstellung, muss bedacht werden, dass die Flugbienen anfangs womöglich Schwierigkeiten haben, den Flugling als ihr Volk wiederzuerkennen, wenn die ursprüngliche Gesamtsilhouette verändert wird. Dann verfliegen sie sich womöglich in nahestehende andere Völker. So erscheint es sinnvoll, den Brutling zunächst auf den Flugling zu stellen. Oder man stellt stattdessen zumindest Leerzargen auf den Flugling, um die ursprüngliche Gesamtsilhouette zu erhalten. Hat man seine Völker am Bienenstand hingegen von vornherein locker mit verschiedenen Flugrichtungen verteilt, scheint es diesbezüglich weniger Probleme zu geben. Dann kann der Brutling sogleich irgendwo anders am selben Bienenstand platziert werden und die Flugbienen fliegen in die Fluglingszarge, die auf dem originalen Beutenboden platziert wurde.
6. Bislang zeigt sich, dass das Sprühen des „OXUVAR 5,7%“ die bessere und wirksamere Applikationsform ist bei der Varroa-Bekämpfung im brutfreien Flug- und Brutling. Sie ist eindeutig zeitaufwendig und muss zügig erfolgen, um keine Räuberei auszulösen. Die Träufel-Applikation kann hingegen ihre Wirkung gar nicht entfalten, weil die Bienen dafür nicht eng genug im Flug- und Brutling sitzen. Bei den vorherrschenden warmen Temperaturen zeigt das Verdampfen von „Varroxal 0,71g/g Bienenstock-Pulver“, nach Aussage von Kollegen, offenkundig eine geringere Wirksamkeit. Von daher scheint es kein Zugewinn zu sein, „Varroxal 0,71g/g Bienenstock-Pulver“ für die Varroa-Bekämpfung bei den Flug- und Brutlingen zu sublimieren. Hier bedarf es weiterer Erfahrungen.

■ Die Vorgehensweise beim „Teilen & Behandeln“ – Schritt für Schritt

Das TuB startet an einem Tag X, den Sie festlegen. Dem folgen dann weitere zeitlich festgelegte Maßnahmen am Tag 2 und am Tag 21 nach Beginn des Konzeptes.

Tag X: Bei gutem Flugwetter wird das Bienenvolk in einen Brut- und Flugling geteilt. Idealerweise beginnt man mit dem Teilen am frühen Morgen. Dann haben die Flugbienen einen ganzen Tag Zeit, in den Flugling zu fliegen. Zudem ist dann beim offenen Hantieren mit den Völkern die Gefahr der Räuberei erheblich reduziert.

Zunächst wird der lange zuvor von den Bienen ausgeleckte Honigraum abgenommen und beiseitegestellt. Die Königin wird aus den Bruträumen gesucht und mit etwas Futterteig gekäfigt und beiseitegelegt. Anschließend werden die Bruträume auf einen neuen Boden gesetzt und der nun entstandene Brutling etwas abseits am Bienenstand mit stark eingegemtem Flugloch aufgestellt. Dabei sollte auch schon darauf geachtet werden, dass der Brutling über ausreichend Futter verfügt. Gegebenenfalls sollten noch Futterwaben zugehängt werden. Auch der ehemalige Honigraum wird mit einer vollen Futterwabe ausgestattet und an den alten Standplatz auf den dort zurückgelassenen Boden gestellt. Dann muss die Königin mit geöffnetem Zugang zum Futterteig in den Flugling gehängt werden. Die Flugbienen finden sich dort ein. Auch beim Flugling muss das Flugloch bis auf wenige

Zentimeter eingeeengt sein, damit die Bienen sich besser verteidigen können. Sollten die Beutenböden des Flug- und Brutlings mit offenen Gittern ausgestattet sein, sollte bis zum Abschluss des TuB eine Windel eingeschoben werden. So wird die Gefahr der Räuberei zusätzlich verringert.

Tag X +2: Zwei Tage nach Erstellung des Fluglings wird dieser kurz auf Weiselrichtigkeit überprüft und anschließend mit dreiprozentiger Oxalsäuredihydrat-Lösung besprüht (2 bis 4 Milliliter pro Wabenseite). Zur Sprühapplikation eignet sich nur das OXUVAR 5,7%. Einige Tage später kann begonnen werden, den Flugling regelmäßig mit kleinen, steten Futtergaben zu versorgen.

Tag X +21: Frühestens 21 Tage nach der Teilung des Bienenvolkes, wenn dann alle Brut auch im Brutling geschlüpft ist, wird zunächst nach einer stiftenden Nachschaffungskönigin beziehungsweise nach Eiern und offener Brut geschaut. Anschließend wird das Bienenvolk auf eine Brutraumzarge eingeeengt, indem die untere Zarge mit dunklen Altwaben weggenommen wird. Nach dem Einengen wird auch der Brutling mit einer dreiprozentigen Oxalsäuredihydrat-Lösung besprüht (2 bis 4 Milliliter pro Wabenseite). Einige Tage später beginnend, muss dann auch die stete Futterversorgung des Brutlings gewährleistet werden.

Die „Brutlinge“ sind grundsätzlich deutlich stärker mit Varroa befallen (85-95 Prozent der Milben des Ausgangsvolkes) als die „Fluglinge“, sodass womöglich fünf bis sieben Tage später (bevor zu viel Brut verdeckelt ist) eine zweite OS-Sprühbehandlung erfolgen muss. Sollte der „Brutling“ eventuell weisellos sein, wird er mit einer begatteten Jungkönigin aus einem schwachen Ableger beweiselt oder notfalls abgekehrt.

■ **Wie geht es später mit dem Flugling und Brutling weiter?**

Ende Oktober wird überprüft, ob die Flug- und Brutlinge eine ausreichende Überwinterungsstärke aufweisen. Gegebenenfalls werden sie dann rückvereinigt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren Bienen! Bleiben Sie gesund!


Dr. Otto Boecking

E-Mail an Ansprechpartner: poststelle.ib-ce@laves.niedersachsen.de

LAVES Institut für Bienenkunde Celle
Herzogin-Eleonore-Allee 5 | 29221 Celle

Unsere Informationsangebote finden Sie unter:
http://www.laves.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=20073&article_id=73177&psmand=23
Unseren YouTube-Kanal finden Sie unter:
https://www.youtube.com/channel/Uck7s4CwVqDEVIYCS_ty3Pfg

- Anhang



Schematisierter Ablauf „TuB“ für 1-zargige Völker, © Dr. Otto Boecking